

FUREDEM® DIURÉTICO TRATAMIENTO DE EDEMAS

¿Qué es FUREDEM®?

FUREDEM® es un diurético eficaz de acción inmediata de uso inyectable indicado para la reducción de todo tipo de estados edematosos y líquidos patológicos en distintas zonas.

¿Cómo funciona FUREDEM®?

FUREDEM® actúa a nivel del asa de Henle produciendo una diuresis potente de instauración rápida y corta duración. Este fármaco bloquea el sistema de co-transporte de Na+K+2Cl-. La acción diurética resulta de la inhibición de la resorción de cloruro sódico en la porción ascendente del asa. Los efectos secundarios de la excreción aumentada de sodio son el incremento de la excreción de orina (debido al agua unida por ósmosis) y el incremento de la secreción de potasio del túbulo distal.

¿Por qué se necesita FUREDEM®?

Para disminuir los procesos edematosos de distintos orígenes. El edema mamario en ganado bovino, puede generar efectos negativos en el animal tales como estrés, dolor, aumento en la susceptibilidad a sufrir heridas a causa de la tensión de la piel, mayor probabilidad de sufrir mastitis y daño al pezón, ubres más caídas, disminución de la producción de leche e inconvenientes en el ordeño. El tratamiento más eficaz para disminuir la cantidad de edema y la duración de la condición es el uso de diuréticos como FUREDEM®. Lo mismo para la acumulación de líquidos en distintas cavidades como ascitis, hidropericardio e hidrotórax, lo cual pueden comprometer la vida del animal. En animales pequeños que sufren edemas pos traumáticos, pos quirúrgicos y por falla cardíaca congestiva puede utilizarse FUREDEM® para disminuir dicha afección.

¿Cuándo aplicar FUREDEM®?

-Edemas de distintos orígenes (ubre, pulmonar, heridas, post traumáticos), No tiene contraindicaciones en vacas o vaquillonas con gestación avanzada.

- Anasarca
- Ascitis
- Hidrotórax
- Hidropericardio



Administración:

Intramuscular IM o Endovenoso EV lenta.

Bovinos 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ml cada 12 horas. El tratamiento no debe exceder las 48 horas post-parto.
Equinos 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 a 10 ml, 1 ó 2 veces/día, a intervalos no menores de 6 - 8 horas.
Caninos y felinos 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 a 1 ml cada 5 kg/PV, 1-2 veces por día. El tratamiento debe aplicarse hasta la desaparición del edema, si es necesario puede instaurarse una terapia de mantenimiento para prevenir recurrencias (ej. en insuficiencia cardíaca).

Contraindicaciones y advertencias:

No administrar en animales con glomerulonefritis aguda o insuficiencia renal aguda, anuria, hipovolemia, deshidratación, cirrosis hepática grave, hipopotasemia. Debido a que aumenta la acción de las drogas antihipertensivas, tener cuidado con la dosificación de las mismas. No utilizar en conjunto con cefalosporinas.

Presentaciones: 25 mL, 50 mL.



Dr. Fabián Cairó
Director Técnico
LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I. y A.



Dr. Leonardo De Luca
Director Científico
LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I. y A.