

# CIPROKYX 200



## Antimicrobiano - Solución para uso oral

### FORMULA:

1 ml contiene:

Ciprofloxacina..... 200 mg

Excipientes c.s.p. .... 1 ml



Uso veterinario



## COFARVET

### DESCRIPCIÓN:

CIPROKYX 200 es una solución antibiótica a base de ciprofloxacina que pertenece al grupo de las quinolonas y que actúa con acción bactericida contra bacterias principalmente Gram negativas como Campylobacter, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella y Salmonella spp.

### PRESCRIPCIÓN:

CIPROKYX 200 está indicado para la prevención y el tratamiento de infecciones gastrointestinales, respiratorias y del tracto urinario causadas por microorganismos sensibles a la ciprofloxacina como Campylobacter, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella y Salmonella spp. en terneros, cabras, aves de corral, ovejas y cerdos.

### DOSIS Y USO:

Para administración oral en agua de bebida.

**Terneros, cabras y ovejas:** Dos veces al día, 5 ml cada 75 - 150 kg de peso corporal durante 3 a 5 días.

**Aves:** a razón de 10 mg/kg de peso corporal. Aproximadamente 100 ml cada 300 - 400 litros de agua de bebida durante 3 a 5 días.

**Porcinos:** a razón de 10 mg/kg de peso corporal. Aproximadamente 100 ml cada 200 - 600 litros de agua de bebida durante 3 a 5 días.

Nota: solo para terneros pre-rumiantes, corderos y cabritos.

Solo se debe preparar suficiente agua medicada para cubrir los requerimientos diarios. El agua medicada debe reemplazarse cada 24 horas.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

### PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Use ropa adecuada y protectora cuando administre medicamentos. Lávese las manos y cámbiese de ropa después de la administración. Almacenar en su envase original a temperaturas entre 15°C y 25°C evitando la luz solar directa en el producto almacenado. Las personas con hipersensibilidad conocida a la droga deben evitar el contacto con el producto. No arroje envases vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. No congelar. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a ciprofloxacina. Administración a animales con una insuficiencia hepática y / o función renal grave. Administración concurrente de tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas.

Efectos secundarios: reacciones de hipersensibilidad. La administración a animales juveniles puede conducir a la artropatía.

CYPROKYX 200 no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

### Restricciones de uso:

Tiempo de retiro: 12 días.

No use gallinas ponedoras en producción de huevos para consumo humano.

### PRESENTACION:

Botellas de 500 ml y 1 litro.