

KYDOX 500



Antibiótico - Polvo para uso oral

FORMULA:

1 g contiene:

Doxiciclina (como hclato) 500 mg*

Excipientes c.s.p 1 g

*(equivalente a 575 mg de doxiciclina hclato).



Uso veterinario



COFARVET

DESCRIPCION:

Kydox 500 es un polvo para uso oral compuesto por doxiciclina que pertenece al grupo de las tetraciclinas y actúa bacteriostáticamente contra muchas bacterias Gram-positivas y Gram-negativas como Bordetella, Campylobacter, E. coli, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus y Streptococcus spp. La doxiciclina también es activa contra Chlamydia, Mycoplasma y Rickettsia spp. La acción de la doxiciclina se basa en la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas. La doxiciclina tiene una gran afinidad por los pulmones y, por lo tanto, es especialmente útil para el tratamiento de infecciones respiratorias bacterianas

PRESCRIPCION:

Kydox 500 está indicado para el tratamiento de infecciones gastrointestinales y respiratorias causadas por microorganismos sensibles a la doxiciclina como Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus y Streptococcus spp. en terneros, cabras, aves de corral, ovejas y cerdos.

DOSIS Y USO:

Administración oral.

Terneros, Caprinos y Ovinos: dos veces al día, 2 g de Kydox 500 cada 200 kg de peso vivo durante 3 a 5 días.

Aves y Cerdos: (20 mg/kg p.v.) 40 mg de Kydox 500 /kg de peso vivo por día. Aproximadamente: 400g cada 2000 - 4000 litros de agua durante 3 a 5 días.

Nota: solo para terneros pre-ruminantes, corderos y cabritos.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en el paquete original en un lugar fresco y seco entre 10° y 25° C, protegido de la luz solar y la humedad. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a las tetraciclinas.

Administración a animales con una función hepática gravemente alterada.

Administración concurrente de penicilinas, cefalosporinas, quinolonas y cicloserina.

Administración a animales con una digestión microbiana activa.

Efectos secundarios:

Decoloración de los dientes en animales jóvenes.

Reacciones hipersensibles.

Restricciones de uso:

Tiempo de espera para terneros caprinos y ovinos: 14 días. Porcinos: 8 días. Aves de corral: 7 días.

PRESENTACION:

Sachets de 100 g, 500 g y 1 kg

